

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o chirurgii.

Implantologia

Najbardziej trwałą i sprawdzoną metodą uzupełniania braków zębowych w szybkim czasie są implanty. Są to śruby wykonane z tytanu, które zastępują korzeń zęba. Na nich można zamocować pojedynczą koronę protetyczną lub most.

korona



implant

Oferujemy Państwu najwyższej jakości materiały i sprzęty, wyspecjalizowany zespół oraz dożywotnią gwarancję na implant w przypadku wybrania odpowiedniej opcji.

Zalety wszczepienia implantu

Estetyka- korona na implancie idealnie wpasowuje się w cały łuk zębowy, nie odróżnia się od pozostałych zębów ponieważ kolor i kształt jest dobierany indywidualnie do każdego pacjenta i jego warunków w jamie ustnej.

Zdrowie- implant pozwala na zachowanie prawidłowych funkcji żucia, które zmieniają się gdy w jamie ustnej są braki zębowe.

Komfort spożywania pokarmów-ten rodzaj odbudowy protetycznej gwarantuje doskonałą funkcjonalność i swobodę, dlatego możliwe jest spożywanie pokarmów różnego rodzaju.

Trwałość- implant wykonany jest z tytanu, dlatego przy stosowaniu się do zaleceń lekarza, odbywaniu wizyt kontrolnych i higienizacji może służyć przez całe życie.

Wygoda- z racji tego, że implant wszczepiony jest na stałe, nie ma konieczności używania klejów mocujących jak w przypadku protez.

Treść objęta jest prawami autorskimi.



SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA
I MEDYCYNA ESTETYCZNA

Etapy leczenia implantologicznego

1 wizyta:

Konsultacja specjalistyczna, wykonanie tomografii komputerowej

2 wizyta:

Plan leczenia wraz z umówieniem wizyt

3 wizyta:

Chirurgiczne wszczepienie implantu

4 wizyta:

Osadzenie korony na implancie po 2 miesiącach od zabiegu

Do czego mogą prowadzić braki w uzębieniu?

- problemy trawienne
- przechylenie się zębów
- wady wymowy
- zaburzenia funkcji stawów skroniowo żuchwowych
- zaburzenia estetyki twarzy
- bóle głowy i kręgosłupa
- brak pewności siebie
- większe koszty leczenia w przyszłości

Implanty klasy Premium - Astra Tech Implant System Ev

- różne kształty implantów
- elastyczny protokół nawiercania
- właściwe komponenty protetyczne
- samopozycjonujące się elementy wyciskowe



Treść objęta jest prawami autorskimi.



SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA
I MEDYCYNA ESTETYCZNA

**DOŻYWOTNIA GWARANCJA
A IMPLANTY KLASY PREMIUM!**

MOŻLIWOŚCI ODBUDOWY IMPLANTOLOGICZNEJ



Korona na implancie

To rodzaj odbudowy protetycznej, która uzupełnia pojedynczy ubytek w uzębieniu. Odzworowuje anatomiczny kształt i kolor zęba. Koronę na implancie osadzamy po około 2 miesiącach po zabiegu implantacji.



Most na implantach

Ten rodzaj odbudowy wykonujemy w przypadku braku kilku znajdujących się obok siebie zębów. Most składa się z kilku połączonych ze sobą koron.



Proteza na implantach

Ten rodzaj uzupełnienia pozwala odbudować cały łuk zębowy. W tym przypadku protezę mocuje się na 4 lub 6 implantach.

Treść objęta jest prawami autorskimi.



SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA
I MEDYCYNA ESTETYCZNA

Podniesienie zatoki szczękowej

Często przed wykonaniem wszczepienia implantów potrzebne jest podniesienie dna zatoki szczękowej, by implanty mogły znaleźć się we właściwym miejscu w szczęce.

Jest to zabieg mający na celu podniesienie błony śluzowej zatoki. Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej może zostać połączony z wprowadzeniem implantów stomatologicznych, jeśli można uzyskać ich stabilizację na wstępnym etapie.

Augmentacja kości

Augmentacja to przeszczep pobranego materiału kostnego lub gotowego materiału. Regeneracja kości jest bezbolesna, przeprowadza się ją w znieczuleniu miejscowym.

Przeszczep dziąsła czyli pokrycie recesji

Zabieg polega na pokryciu odsłoniętego korzenia zębowego, poprzez przeszczepienie fragmentu podniebienia lub dziąsła z innego obszaru jamy ustnej.

Wskazania do zabiegu:



Wskazaniem może być utrata zębów w bocznym odcinku szczęki, jeśli u pacjenta występuje anatomicznie nisko schodzącą zatoka szczękowa. Ta sytuacja powoduje brak odpowiedniej ilości kości pozwalającej na poprawne wszczepienie implantów.

Wskazania do zabiegu:

Augmentację kości przeprowadza się w przypadku zaniku kości, przed planowaną implantologiczną odbudową braków zębowych. Innym wskazaniem do zabiegu jest paradontoza czy kieszenie przyzębne.

Wskazania do zabiegu:

Schorzenie do którego dochodzi przez odsuwanie się dziąsła. W ten sposób szyjka zębowa zostaje odsłonięta, a w konsekwencji ząb ulega wydłużeniu. Recesja jest jedną z najbardziej zaawansowanych form choroby dziąseł. Często wykonywany w przypadku implantacji.



Treść objęta jest prawami autorskimi.



SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA
I MEDYCYNA ESTETYCZNA

Zalecenia po zabiegu podniesienia zatoki szczękowej, augmentacji kości, po przeszczepie dziąseł oraz implantacji

W celu lepszego przebiegu procesu gojenia po zabiegu, zaleca się zapoznanie i stosowanie się do przedstawionych wytycznych.

Po zabiegu implanty zostają najczęściej natychmiast prowizorycznie zaopatrzone. Ostateczne zabezpieczenie następuje po upływie 2 miesięcy po zabiegu. Przy implantach dwufazowych, które zaszyto, to znaczy, kiedy implant nie wystaje z błony śluzowej, implanty zostaną zabezpieczone śrubami zablizniającymi. Dopiero później następuje właściwa rekonstrukcja protetyczna.

- w dniu zabiegu i dwa dni po zabiegu nie palić nie pić alkoholu
- nie wykonywać żadnego wisitku fizycznego
- ograniczyć mówienie
- jeść i pić dopiero po upływie miejscowego znieczulenia
- przyjmować tylko płynne i miękkie pożywienie
- nie gryźć w okolicach implantu
- dbać o pozostałe zęby stosując ścisłą higienę jamy ustnej
- usta w okolicy rany tylko przepłukiwać
- po zabiegu nie należy używać szczoteczki elektrycznej w okolicy rany
- po jedzeniu delikatnie i krótko przepłukać jamę ustną zimną wodą lub płukanka zaleconą przez lekarza
- nie należy dotykać okolic implantu/rany pozabiegowej palcami ani językiem
- w okolicy miejsca zabiegu, policzka i podbródka może wystąpić obrzęk, który po kilku dniach zniknie
- złagodzenie tych objawów można uzyskać stosując zimne okłady

PRF- szybsze gojenie dzięki fibrynie bogatopłytkowej

Czynniki wzrostu zawarte w trombocytach inicjują i przyspieszają procesy naturalnej regeneracji oraz odbudowy tkanek i przyspieszają gojenie.

- szybsze i lepsze rezultaty gojenia
- szybsza odbudowa kości
- lepsza integracja implantu z kością
- brak zespołu suchego zębodołu
- otrzymanie autogennej membrany regeneracyjnej przy implantacji

Treść objęta jest prawami autorskimi.



Zalecenia po usunięciu zęba

- Należy zagryzać tampon przez 30 minut. W przypadku przedłużonego krwawienia można zmienić tampon i ponownie zagryźć na kolejne pół godziny (jałowe tampony dostępne są w każdej aptece).
- W przypadku odczuwalnego bólu i ewentualnego obrzęku można przykładać do policzka zimne okłady.
- Przez 2 h nie można jeść i pić. Przez 24 h nie wolno palić papierosów, spożywać alkoholu, pić gorących płynów, płukać jamy ustnej.
- Wieczorem delikatnie umyć zęby omijając ranę. Skrzep znajdujący się w zębodole jest najlepszym opatrunkiem zapewniającym prawidłowe gojenie rany. Szary nalot na skrzepie jest naturalnym obrazem gojenia.
- Ranę należy delikatnie smarować kilka razy dziennie żelem odkażającym Elugel.
- Po zejściu znieczulenia w razie konieczności można zażyć leki przeciwbólowe (np. Paracetamol, Apap, Ibuprofen, Nurofen, Panadol). Czasami lekarz dentysta przepisuje silniejsze leki przeciwbólowe dostępne na receptę (np. Ketonal, Febrofen). Należy pamiętać o zażywaniu zapisanych leków zgodnie z zaleceniami.
- W przypadku przedłużającego się krwawienia lub wystąpienia po kilku dniach silnego bólu należy jak najszybciej skontaktować się z naszym gabinetem.
- Po usunięciu zęba normalną reakcją jest pojawienie się obrzęku (opuchlizny policzka) i trudności w otwieraniu ust. Objawy mogą się nasilać do 48 godzin po zabiegu, następnie powinny ustępować. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym lekarzem.
- Niewskazany jest wysiłek fizyczny.
- W przypadku założenia szwów, proszę zgłosić się po 7 dniach w celu ich ściągnięcia.



Treść objęta jest prawami autorskimi.



SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA
I MEDYCYNA ESTETYCZNA

Wszelkie materiały (teksty, treści, zdjęcia) są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy "Ustawy o prawie autorskim i sprawach pokrewnych"

z dnia 4 lutego 1994r. (tekst ujednoczony: Dz.U. 2006 nr 90 poz.631).

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub części bez zgody autora jest zabronione.



**SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA
I MEDYCYNA ESTETYCZNA**

Marzena Helwich

© Copyright by Paulina Mielnik
CENTRUM STOMATOLOGII WICHROWE WZGÓRZE

Poznań, 30 czerwca 2021 roku